

# 生活の中の物理学

## Physics in Everyday Phenomena

第3回 2024/10/7


### 第2章 力学—Newtonの運動法則



真貝 寿明  
Hisaaki Shinkai

<https://www.oit.ac.jp/is/shinkai/mukogawa>

2023年1月に中国・紫金山天文台と南アフリカのアトラス望遠鏡によって発見された非周期彗星である「紫金山・アトラス彗星 (C/2023 A3; Tsuchinshan-ATLAS)」が接近している。9月28日に太陽に最接近し、この数日前から10月初めごろまで明け方の東の低空に姿を現す。当初は1等級前後まで明るくなると予想されていたが、9月中旬までの観測を元にした予想では3等級前後になるとみられている。日の出45分前の高度が約5度以下と非常に低い。10月中旬は夕空に見えるようになる。







2024/10

神戸新聞ホーム > 社会

## 紫金山・アトラス彗星、10月中旬が見頃 明石市立天文科学館の館長が撮影成功


2024/9/26 20:17



社会 明石



井上毅館長が撮影した紫金山アトラス彗星=9月26日早朝、加西市(天文科学館提供)


**縣秀彦**  
 1日前 · 🌐

ようこそ！  
 紫金山・アトラス彗星 Tsuchinshan-ATLAS (C/2023 A3) 。  
 薄雲の向こうでも、肉眼で確認可能な明るさに。双眼鏡で見るとコマとコマ周辺の尾（たぶん、ダストテイル）がかなりはっきりと見えます。写真に撮ると尾がとても伸びていて迫力ある姿。コマが水平線から上がる前から尾が写るぐらいしっかりした明るい尾です。西の空に移ってからの姿が楽しみです。多くの人たちが楽しめますように。  
[#紫金山アトラス彗星](#)

<https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202409/0018164680.shtml>






表1 紫金山・アトラス彗星の位置と明るさ (日の入り1時間後、東京の場合)

日付	時刻	方位と地平高度	明るさ
10月12日	18時09分	西1度	1.5~2.5等
10月13日	18時08分	西5度	1.5~3等
10月14日	18時06分	西10度	1.5~3等
10月15日	18時05分	西14度	1.5~3等



# 前回のミニッツペーパーから

[2-4]

実験、実験の動画ばかり、物理を身近に感じさせておもしろかった！  
私は中学・高校で物理の内容が好きで、身近なものに物理の法則があらわされるのがおもしろいと感じたから。

実験がおもしろかったぞ

オゾン層はなぜ落ちてこないのか

O<sub>3</sub>の分子量は48, 空気より重いので沈殿しますが, 簡単にO<sub>2</sub>に分解してしまいます.  
紫外線で作られるので地球上空に多い. 地球を紫外線から守ってくれている.

私の好きな創作サイトは,

ヒュクス=高加速標銃機, という 加速すれば必ず加速する ガウス王, というのが

あるんですが, 物理学的に あり得る存在なのか お聞きしたいです。

SCP-320 と調べると出るとおもいます

(このようにおもしろいサイトのため  
誰か理解をしよう)

何を書いているのかわからない怪しいサイトです. 物理用語を使っているようででたらめです.



## 前回のミニッツペーパーから

星が好きなので宇宙論をもっと知りたいです 😊

3限の「最先端物理学が描く宇宙」を受講してください。  
あるいは資料をGoogle Classroom tv2fg2n でどうぞ。

宇宙と物理の  
間わりが知りたいです。

宇宙はビッグバンから始まった、宇宙にはブラックホールがある、  
星の一生はどうなっているか.... すべて物理です。

宇宙人は本当に実在するのか。人間と共存できるのか。

わかりません。

宇宙に生命体があるのかどうか、宇宙に知的生命体があるのかどうか。  
あと10年経てば、前者は、わかってくるかと思われま。



## 前回のミニッツペーパーから

重力が小さくなると時間が速く進むなら  
ず。と宇宙にいる人はふけるのか気になります。

重力が弱いと時間の進み方は速くなりますが、何倍も違うわけではありません。  
一方、光速近くで移動するほど、時間の進み方は遅くなります。光速で飛べば時間は進みません。  
どちらもアインシュタインが発見した「相対性理論」の効果です。

油に火がつくとよく燃えるのはどうしてですか

燃焼 = 炭素が酸素と結合して熱を放出する現象。  
油の中には炭素が多く含まれる。油が酸化することで燃えやすくなる。  
(古いてんぷら油は燃えやすい。油は自然発火することもある。発火温度は380度)

熱した油に水を入れると、沈下した水がすぐに沸騰して上の油を飛散させるので危険



# 前回のミニッツペーパーから

卵を高い所から落とすとして、  
とんちんかたをひたしてまもるのか  
見えてほしいです。

卵が割れる ← 力(撃力)が加わるから

割れないようにするためには、

落下速度を遅くする(パラシュートなど)

衝撃を少なくする(着地面積を広げる、

柔らかいもの・衝撃吸収材を敷く)

卵形状は縦方向に強いので縦に落下するようにする

酸性雨水に当たり続けると人は溶けるのか？

溶けないです。二酸化炭素が純水に溶けるとpH 5.6

酸性雨は硫黄や窒素の酸化物が溶け込んだpH 5.6以下のもの。

人間の肌は、強い酸性で火傷し、強いアルカリ性で溶ける。

標準色カード



PH値の測定標準は1-14までです。PH7を中性とし、それ未満を酸性、それより大きければアルカリ性としています。

波(光)のところの説明します。


虫について知りたい。

車を運転していると起こる蒸発現象の仕組みを解説してほしい。

逃げ水のことかな..



# 光の屈折 (温度が高いと屈折率が下がる)



# 速さの定義

知っておくと便利な速度(基準とされる速度)

表 2.1 知っておくと便利な速さ

人の歩く速さ	分速 80 m (不動産広告で徒歩〇分というときの基準) 時速 4 km (江戸時代の距離の単位 = 1 里)
マラソン選手の走る速さ	分速 280 m (= 42.195 km / 150 分)
新幹線の速さ	時速 180 km = 3000 m/分 = 50 m/s
旅客機の速さ	時速 900 km
音速	340 m/s (温度 $T$ によって若干変化する)
光速	30 万 km/s (1 秒間で地球を 7.5 周する)

## 定義 速さ (1)

$$\text{速さ [m/s]} = \frac{\text{移動した距離 [m]}}{\text{かかった時間 [s]}} \quad (2.1)$$

## 定義 速さ (2)


速さ  $v$  を, 次式で定義する.

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad \text{速さ} = \frac{\text{移動した距離}}{\text{かかった時間}} \quad (2.3)$$



# 前回のミニッツペーパーから

竜巻で人は飛ぶのが気が狂います  
→ どのくらい規模



## 台風の風速の目安



15m/s 看板がとびはじめる



20m/s 小枝が折れる  
これ以上の風を予想した場合  
暴風警報を発表します



25m/s かわらがとぶ  
テレビアンテナが倒れる



30m/s 戸がはずれ、  
家が倒れることもある

第8図 風と災害 10分間の平均風速と被害のおよその関係





## 前回のミニッツペーパーから

光と音の伝わり速さが“違うのはなぜ”ですか？

音は空気分子を振動させて伝わります。温度が高いほど音速が大きい。  
光は、光子という粒子の移動です。真空中でも伝わり、光速は一定です。






# 加速度の定義

## 定義 加速度

速度の増減の具合を加速度として定義する。

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{\text{速度の変化 [m/s]}}{\text{かかった時間 [s]}} \quad \text{単位は [m/s}^2\text{]} \quad (2.9)$$



物理では、**加速度が重要!**

- ①重力による自由落下は、加速度の大きさ  $g=9.8 \text{ [m/s}^2\text{]}$  の等加速度運動
- ②力を加えると、加速度が生じる（ニュートンの運動方程式）

表 2.2 おもな加速度の大きさ

乗り物	加速度 [m/s <sup>2</sup> ]	加速度 [G]
通勤電車（発進時）	0.7~1.5	0.71~0.15
エレベータ	< 1.0	< 0.10
乗用車（発進時）	1.5~2.0	0.15~0.20
旅客機（離陸時）	2.0	0.20
ジェットコースター	< 60	< 6.12
スペースシャトル（打ち上げ時）	30~40	3.06~4.08

## 運動1

## 等加速度直線運動

## 等速運動する物体の位置

はじめ (時刻  $t = 0$ ), 物体の位置が  $x(0) = x_0$  であったとする. 一定の速度  $v$  で運動すると, 時刻  $t$  での加速度, 速度, 位置は次の式で表される.


$$a(t) = 0 \quad (2.10)$$

$$v(t) = v \quad (\text{一定値}) \quad (2.11)$$

$$x(t) = x_0 + vt \quad (\text{直線の式}) \quad (2.12)$$



## 加速度ゼロ



## 速度一定





図 2.1: 等速運動の  $a-t$  グラフ,  $v-t$  グラフ,  $x-t$  グラフ.



## 運動1

## 等加速度直線運動

## 等加速度運動する物体の位置と速度

はじめ (時刻  $t = 0$ ), 物体の位置が  $x(0) = x_0$ , 速度が  $v(0) = v_0$  であったとする. 一定の加速度  $a$  で運動すると, 時刻  $t$  での加速度, 速度, 位置は次の式で表される.

$$a(t) = a \quad (\text{一定値}) \quad (2.13)$$

$$v(t) = v_0 + at \quad (\text{直線の式}) \quad (2.14)$$

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \quad (\text{放物線の式}) \quad (2.15)$$

加速度一定

速度次第に速く




図 2.2: 等加速度運動の  $a-t$  グラフ,  $v-t$  グラフ,  $x-t$  グラフ.

$$x = x(t)$$

x-t グラフ

微分 ↓ ↑ 積分

傾き ↓ ↑ 面積

$$v = v(t)$$


v-t グラフ

微分 ↓ ↑ 積分



傾き ↓ ↑ 面積

$$a = a(t)$$



a-t グラフ




(c) x-t グラフ





(b) v-t グラフ





(a) a-t グラフ



(c) x-t グラフ



(b) v-t グラフ




(a) a-t グラフ



Topic

# 「ダイヤの乱れ」のダイヤとは

列車の時刻表を  $x-t$  グラフで一覧できるように表したものをダイヤグラムという。上下の列車をすべて書いていくと，図面がダイヤモンド型に見えるからである。荒天や事故などで列車の運行が乱れるときには「ダイヤの乱れ」が生じた，という言葉がよく使われる。





### 実験 1 神経の反応時間を測ろう

友達に鉛筆の上端を持ってもらい、自分はその鉛筆の下の端を、人差し指と親指で挟めるように待つ状態にする。友達が鉛筆を落下させてから、何 cm のところで指を挟んで止められるだろうか。目でみてから指先までに命令が伝わる神経の反応時間  $t$  を測る実験だ。



$x$  [cm] でつかめたら、自由落下する長さは  $x = \frac{1}{2}gt^2$  なのだから、 $t = \sqrt{2x/g}$  である。  $x = 10$  cm なら  $t = \sqrt{2 \cdot 0.1/9.8} = 0.143$  s,  $x = 15$  cm なら  $t = \sqrt{2 \cdot 0.15/9.8} = 0.175$  s となる。



# 運動3 鉛直方向への自由落下運動

自由落下運動は等加速度運動！

重力加速度  $g = 9.8 \text{ [m/s}^2\text{]}$



## 宿題（任意）


**問2.1** 国際宇宙ステーション (ISS) は約 90 分で地球を 1 周する。地球の半径は 6370 km, ISS の高度は地表から約 370 km である。ISS の速度はどのくらいか。

**問2.2** 地球は自転により, 24 時間で 1 周する。地球が半径 6370 km の球であるとして, 赤道上での自転の速さはいくらか。

**問2.3** 地球は公転により, 太陽のまわりを 1 年間で 1 周する。軌道が半径 1 億 5000 万 km の円であるとして, 公転速度はいくらか。

**問2.4** 流れる速さが 10 [m/s] の川がある。上流から下流まで 5 km の距離を秒速 20 [m/s] の速さを出せるエンジンをつけた船で往復した。経過した時間はどのくらいか。



**Advanced** 放物線の軌道方程式

ボールを投げる時刻を  $t = 0$ 、ボールを投げる位置を  $(x, y) = (0, 0)$  とすれば、

- 水平方向 ( $x$  方向) は、等速運動。初速度を  $v_{0x}$  とすれば、 $t$  秒後の位置  $x(t)$  は、

$$x(t) = v_{0x}t \quad (2.26)$$

- 鉛直方向 ( $y$  方向) は、等加速度運動。初速度を  $v_{0y}$  とすれば、 $t$  秒後の位置  $y(t)$  は、

$$y(t) = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \quad (2.27)$$


となる。この2本の式から、 $t$  を消去すると、

$$y = \frac{v_{0y}}{v_{0x}}x - \frac{g}{2v_{0x}^2}x^2 \quad (2.28)$$

となって、2次曲線（放物線）になる。総じて、 $y = x^2$  の2次曲線のことを放物線というようになった。

# 前回のミニッツペーパーから

1 水平に飛行している飛行機から車輪が落下した。地面に立って落下の様子を見たとき、車輪の落下する軌跡に近いものはどれか。



- |       |    |
|-------|----|
| 1 と思う | 9人 |
| 2 と思う | 2人 |
| 3 と思う | 7人 |
| 4 と思う | 2人 |
| 5 と思う | 7人 |
| 6 と思う | 0人 |
-



いろいろな運動 p33

- 運動1 等速直線運動
- 運動2 等加速度直線運動
- 運動3 鉛直方向の自由落下
- 運動4 放物運動 (水平投射)
- 運動5 単振動
- 運動6 放物運動 (斜め投射)
- 運動7 放物運動 (空気抵抗)
- 運動8 減衰振動
- 運動9 円運動

いろいろな力 p40

- 力1 重力
- 力2 張力
- 力3 抗力
- 力4 摩擦力
- 力5 弾性力
- 力6 万有引力
- 力7 遠心力・慣性力
- 力8 コリオリ力・転向力
- 力9 圧力
- 力10 表面張力
- 力11 浮力

# 力1 重力

## 法則 地球表面での重力の大きさ

質量  $m$  [kg] の物体には、重力加速度  $g = 9.8 \text{ m/s}^2$  がはたらく。重力の大きさ  $W$  は、次のようになる。

$$W = mg \quad (2.29)$$




$$\text{重力 [N]} = \text{質量 [kg]} \times \text{重力加速度 [m/s}^2\text{]}$$

### 単位

力は [N] (ニュートン)。

重力には [kg 重] (キログラム重) も使う。

$$1 \text{ kg 重} = 9.8 \text{ N}$$



## 力2 張力

## 力3 抗力



## 2.3 ニュートンの運動法則

## ニュートンの運動法則

## 第1法則 慣性の法則 (law of inertia)

物体は慣性を持つ（そのままの運動状態を保とうとする）。  
力を加えなければ，物体は等速直線運動を行う。

## 第2法則 運動方程式 (equation of motion)

物体に力  $F$  を及ぼすと，物体の質量  $m$  に反比例した加速度  $a$  が生じる。

## 第3法則 作用反作用の法則 (law of action-reaction)


物体に力  $F$  を及ぼすと，同じ大ききで逆向きの反作用  $-F$  がその物体から及ぼされる。

## ニュートンの運動方程式

第2法則を式で表すと次のようになる。力を  $F$ ，質量を  $m$ ，加速度を  $a$  とする。

$$F = ma \quad (2.4)$$

Isaac Newton  
(1642–1727)




質量  $m$  の単位は [kg]  
加速度  $a$  は [m/s<sup>2</sup>]  
力  $F$  は [N]



## 第1法則： 慣性の法則


### 法則 ニュートンの運動法則（第1法則）：慣性の法則

物体は慣性をもつ（そのままの運動状態を保とうとする）。力を加えなければ、物体は等速直線運動を行う。



Galileo Galilei  
(1564-1642)

斜面に球を置いて手をはなすと、球は加速しながら転がり落ちる。斜面の角度を急にすれば加速は一層速くなる。一方で斜面の上向きにボールを放つとボールは減速してゆく。この場合も減速は斜面の角度に依存する。それでは、水平面ならば、ボールはどのように動くだろうか。—加速も減速もせず、そのままの運動を保ち続けると考えるのが自然である。（『天文対話』1632年）





## 第1法則： 慣性の法則

動く発射台から  
投げ上げ

© 数研出版

動く発射台から投げ上げ (数研出版「物理図録」)

# 前回のミニッツペーパーから

2 等速で動いている列車内で物を落とすと？

- 前方に落ちる . . .
- 足元に落ちる . . .
- 後方に落ちる . . .

減速している列車内で物を落とすと？

- 前方に落ちる . . .
- 足元に落ちる . . .
- 後方に落ちる . . .

どちらも正解 6名



科学トップ

科学なぜなぜ110番

環境なぜなぜ110番

学研キッズネット


科学

科学なぜなぜ110番

理科の実験

電車の中でジャンプしてもどうして同じところに落ちるの

## 電車の中でジャンプしてもどうして同じところに落ちるの



<https://kids.gakken.co.jp/kagaku/kagaku110/science0586/>





# GRAVITY

Gravity (2013)

<http://www.youtube.com/watch?v=xgGPTa7-vIE>

(start on click, 1:16)

# CDホバークラフトで実験しよう





## 第2法則： 運動の法則

**法則** ニュートンの運動法則（第2法則）：運動方程式

物体に力  $F$  を及ぼすと、物体の質量  $m$  に反比例した加速度  $a$  が生じる。

$$F = ma$$

2つ以上の力が加わっていたとしても、その合力で加速度が決まる。

$$\sum_i F_i = ma$$

**【少し高級な疑問】**

第2法則があれば、第1法則はいらない？



## 第2法則があれば, 第1法則はいらない?

### Advanced | 第1法則は不要か?

力がつりあって, 合力がゼロであるときを考えよう.

$$\sum_i \mathbf{F}_i = 0$$

この式は,  $\mathbf{a} = 0$  となり, 加速度がゼロであることを意味する. 積分すると, この場合の物体の速度は,  $\mathbf{v} = \text{一定}$  となり, 等速直線運動をすることになる.

聡明な読者は, 「それでは, ニュートンの運動方程式は, 慣性の法則も含んでいるので, 慣性の法則は不要ではないか」と心配されるかもしれない. だが, 慣性の法則が第1法則として君臨しているのには, 相応の理由がある.

ニュートンは, まず慣性の法則を宣言して, 「力がはたらかない場合には, 等速直線運動をする座標系 (慣性座標系) を考えましょう」と密かにメッセージを送っているのだ. 実際には地球は自転しているし, 太陽のまわりを公転している. 太陽も銀河系を周回しているし, 銀河系も銀河団として運動している. 私たちが実験しても, 本当に正確に「力がはたらかない」世界はありえない. しかし, まず, 理想的な座標系を一つ宣言してしまえば, 後は自由に数学を使って議論することが可能になる. 慣性座標系を定義することが, 第1法則の本当の意味だったのである.



## 第2法則： 運動の法則

力を加えると

重力 (万有引力)

摩擦力 (抵抗力)

抗力

弾性力

張力

浮力

大気圧の力

電気力

磁石の力

.....

大きさだけでなく、  
向きを含めて成り立つ

The diagram shows the equation  $\vec{F} = m\vec{a}$ . Above the vector  $\vec{F}$  is a black arrow pointing to the right. Above the vector  $\vec{a}$  is a black arrow pointing to the right. A red arrow points from the text '大きさを...' to the vector  $\vec{a}$ .

加速度が生じる

運動がわかる！

速度がわかる  
位置がわかる

## 第3法則：作用・反作用の法則

**法則** ニュートンの運動法則（第3法則）：作用・反作用の法則

物体に力  $F$  を及ぼすと、同じ大きさで逆向きの反作用  $-F$  が、その物体から及ぼされる。




図 2.55 作用・反作用の法則 力は必ず二つの物体間で生じていて、お互いが力を介して運動する。



## 第3法則:作用・反作用の法則

### コラム 8 作用・反作用を考えるとロケットは飛ぶはずがない？

ロケット開発研究が進む 1920 年 1 月 23 日, ニューヨーク・タイムズ紙は, ゴダード博士 (Robert H. Goddard, 1882–1945) の研究に対して, 社説で次のように批判した。「真空の宇宙では, 後ろへ押すものがないために, ロケットは前に進むことができない. ゴダード博士たちは, 高校で習う作用・反作用の法則すら理解していないようだ。」

しかし, いまではわれわれは, ロケットは宇宙で飛行できることを十分に知っている. 作用・反作用の法則を拡張すると運動量保存則 (⇒ 2.5.2 項) になるが, 運動量保存則によれば, ガスを後方に噴射すれば, ロケットは逆に前方への推進力を得られる. そして, 一度速度をもてば慣性の法則によってロケットはその速度で飛行を続ける.

ニューヨーク・タイムズ紙は, 人類が初めて月面に立つ 3 日前 (アポロ 11 号が打ち上げられた翌日) の 1969 年 7 月 17 日, この社説の誤りを認め謝罪文を掲載した. ゴダード博士の死から 24 年が経っていた.

### A Correction

On Jan. 13, 1920, "Topics of The Times," an editorial-page feature of The New York Times, dismissed the notion that a rocket could function in a vacuum and commented on the ideas of Robert H. Goddard, the rocket pioneer, as follows:


"That Professor Goddard, with his 'chair' in Clark College and the countenancing of the Smithsonian Institution, does not know the relation of action to reaction, and of the need to have

something better than a vacuum against which to react—to say that would be absurd. Of course he only seems to lack the knowledge ladled out daily in high schools."

Further investigation and experimentation have confirmed the findings of Isaac Newton in the 17th Century and it is now definitely established that a rocket can function in a vacuum as well as in an atmosphere. The Times regrets the error.



# 猫 (1905年, 映画化1936年)



吾輩は猫である。名前はまだ無い。

どこで生まれたか頓と見當がつかぬ。何でも暗薄いじめじめした所でニャー／＼泣いて居た事丈は記憶して居る。吾輩はこゝで始めて人間といふものを見た。然もあとで聞くとそれは書生といふ人間で一番獰悪な種族であつたさうだ。此書生といふのは時々我々を捕へて煮て食ふといふ話である。然し其當時は何といふ考もなかつたから別段恐しいとも思はなかつた。



丸山定夫 (主人、珍野苦沙弥)  
(吾輩)


徳川夢声 (迷亭)

藤原釜足 (越智東風)

北沢彪 (水島寒月)

<https://www.youtube.com/watch?v=RwCGXFbN7yo>





<http://neko.koyama.mond.jp/?day=20070423>



## Newtonの運動法則

今しも敵軍から打ち出した一弾は、照準誤たず、四つ目垣を通り越して桐の下葉を振り落して、第二の城壁即ち竹垣に命中した。随分大きな音である。ニュートンの運動律第一に曰く**もし他の力を加うるにあらざれば、一度び動き出したる物体は均一の速度をもって直線に動くものとす**。もしこの律のみによって物体の運動が支配せらるるならば主人の頭はこの時にイスキラスと運命を同じくしたのである。幸にしてニュートンは第一則を定むると同時に第二則も製造してくれたので主人の頭は危うきうちに一命を取りとめた。**運動の第二則**に曰く**運動の変化は、加えられたる力に比例す、しかしてその力の働く直線の方****向において起るものとす**。これは何の事だか少しくわかり兼ねるが、かのダムダム弾が竹垣を突き通して、障子を裂き破って主人の頭を破壊しなかったところをもって見ると、ニュートンの御蔭に相違ない。



もしこの律のみによって物体の運動が支配せらるるならば主人の頭はこの時にイスキラスと運命を同じくしたのである。

漱石, 吾輩は猫である (八) より


## イスキラス = アイスキュロス

ギリシャ三大悲劇詩人の一人アイスキュロスは占い師から

「しかじかの日に、頭の上に何かが落ちてきて死ぬだろう」と予言されたので、その日は、危険な建物や樹木などから離れ、広い野原の真ん中に避難した。ところが鷲が、爪に掴んでいた亀を空高くから落とし、アイスキュロスは甲羅で脳味噌を割られた（ラブレ 『パンタグリユエル物語』 第四之書）。

夏目漱石『吾輩は猫である』 8では、鷲が下界にぴかと光ったものをねらって亀を落とすと、それはイスキラスの禿げ頭だった、と語られる。

<http://nikitoki.blog.so-net.ne.jp/2009-06-17-4>



BC525–496



# 「首縊りの力学」


漱石『吾輩は猫である』より

「この絞殺を今から想像して見ますと、これを執行するに二つの方法があります。第一は、彼《か》のテレマカスがユーミアス及びフヒリー シャスの援《たすけ》を藉《か》りて縄の一端を柱へ括《くく》りつけます。そしてその縄の所々へ結び目を穴に開けてこの穴へ女の頭を一つずつ入れておいて、片方の端をぐいと引張って釣し上げたものと見るのです」「つまり西洋洗濯屋のシャツのように女がぶら下ったと見れば好いんだろう」

「その通りで、それから第二は縄の一端を前のごとく柱へ括り付けて他の一端も始めから天井へ高く釣るのです。そしてその高い縄から何本か別の縄を下げて、それに結び目の輪になったのを付けて女の頸《くび》を入れておいて、いざと云う時に女の足台を取りはずすと云う趣向なのです」

「たとえば云うと縄暖簾《なわ のれん》の先へ提灯玉《ちょうちんだま》を釣したような景色と思えば間違はあるまい」

「提灯玉と云う玉は見た事がないから何とも申されませんが、もしあるとすればその辺のところかと思えます。——それでこれから力学的に第一の場合は到底成立すべきものでないと云う事を証拠立てて御覧に入れます」



寒月君は左の方法は力学的に成立し得ないと言っている。

北沢彪 (水島寒月)

<http://luna-physics.cocolog-nifty.com/blog/2011/09/post-cb4c.html>




## 「首縊りの力学」

漱石『吾輩は猫である』より

「まず女が同距離に釣られると仮定します。また一番地面に近い二人の女の首と首を繋いでいる縄は水平と仮定します。そこで $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_6$ を縄が地平線と形づくる角度とし、 $T_1, T_2, \dots, T_6$ を縄の各部分が受ける力と見做し、 $T_7 = X$ は縄のもっとも低い部分の受ける力とします。 $W$ は勿論女の体重と御承知下さい。どうです御分りになりましたか」

迷亭と主人は顔を見合せて「大抵分った」と云う。但しこの大抵と云う度合は両人が勝手に作ったのだから他人の場合には応用が出来ないかも知れない。





# 「首縊りの力学」

漱石『吾輩は猫である』より

「さて多角形に関する御存じの平均性理論によりますと、下のごとく十二の方程式が立ちます。

$$T_1 \cos \alpha_1 = T_2 \cos \alpha_2 \cdots \cdots (1) \quad T_2 \cos \alpha_2 = T_3 \cos \alpha_3 \cdots \cdots (2) \quad \cdots \cdots$$


「方程式はそのくらいで沢山だろう」と主人は乱暴な事を云う。

「実はこの式が演説の首脳なんですが」と寒月君ははなはだ残り惜し気に見える。

「それじゃ首脳だけは逐《お》って何う事にしようじゃないか」と迷亭も少々恐縮の体に見受けられる。

「この式を略してしまおうとせっかくの力学的研究がまるで駄目になるのですが……」

「何そんな遠慮はいらんから、ずんずん略すさ……」と主人は平気で云う。



# 「首縊りの力学」

漱石 『吾輩は猫である』 より

寒月君が言いたかったこと。


鉛直方向を考えると、12人それぞれの重力をWとして、つりあいの式が右のようになる。

寒月君が言うように全体が対称なら、 $T_1 = T_{13}, \alpha_1 = \alpha_{13}$

なので、

$$12W = 2T_1 \sin \alpha_1$$

となる。W=40 kg重、 $\alpha_1=30^\circ$ とすると、 $\sin 30^\circ = 0.5$ なので、綱を引っ張っている力  $T_1=12W$  となる。結局、綱を引っ張る力は480kg重となる。可能なのか??



$$\begin{aligned}
 W &= T_1 \sin \alpha_1 - T_2 \sin \alpha_2 \\
 W &= T_2 \sin \alpha_2 - T_3 \sin \alpha_3 \\
 W &= T_3 \sin \alpha_3 - T_4 \sin \alpha_4 \\
 W &= T_4 \sin \alpha_4 - T_5 \sin \alpha_5 \\
 W &= T_5 \sin \alpha_5 - T_6 \sin \alpha_6 \\
 W &= T_6 \sin \alpha_6 - T_7 \sin \alpha_7 \\
 W &= T_7 \sin \alpha_7 + T_8 \sin \alpha_8 \\
 W &= -T_8 \sin \alpha_8 + T_9 \sin \alpha_9 \\
 W &= -T_9 \sin \alpha_9 + T_{10} \sin \alpha_{10} \\
 W &= -T_{10} \sin \alpha_{10} + T_{11} \sin \alpha_{11} \\
 W &= -T_{11} \sin \alpha_{11} + T_{12} \sin \alpha_{12} \\
 + \quad W &= -T_{12} \sin \alpha_{12} + T_{13} \sin \alpha_{13} \\
 \hline
 12W &= T_1 \sin \alpha_1 + T_{13} \sin \alpha_{13}
 \end{aligned}$$



# 夏目漱石と寺田寅彦



(1867-1916)



(1878-1935)



多摩川上水畔にて。桜並木下で昼食。撮影：須賀太郎、昭和9年4月。  
左より、大瀬嬢（女子大の水泳選手）、寺田寅彦、日比谷夫人（某重役夫人）、黒田初子夫人  
（料理研究家、登山家）、黒田正夫



## 課題

- 課題タイトル 寺田寅彦『〇〇〇』を読んで
- 内容を簡単にまとめた後、自身で考えたこと（調べたこと・研究したこと）を述べよ。  
（絶賛する必要はない。寺田のコメントに異論があれば、そのようにレポートして欲しい。）



## 提出手順

- A4用紙3-4枚程度。手書き・PC印刷どちらも可。表紙は不要。（手書きの場合は写真撮影したものを提出）
- 必要であれば、図や表を添付してよい。（上記のページ枚数に含める）。
- 〆切は、**10月31日（木）22:59**  
Google Classroom の課題として提出。
- 提出ファイルの名前は、「P 大日 XXXXXXXX 〇〇〇〇」の形式とすること。（XXXXXXXは学籍番号、〇〇〇〇は氏名）とすること。本文中にも学籍番号と氏名を記入すること。
- 参考とした文献（web ページ含む）などがあれば、**必ず**記すこと。剽窃行為が認められる場合は評価を下げます。（参考文献から引用するのは構いませんが、引用範囲は必ずそう明記すること。）



たとえば, , ,



## 第一章、自然と生物 18編

- どんぐり
- 竜舌蘭
- 花物語
- 芝刈り
- 球根
- 蓑虫と蜘蛛
- ねずみと猫
- 子猫
- 解かれた象
- からすうりの花と蛾
- 藤の実
- とんびと油揚げ
- あひると猿
- 日本人の自然観
- 池
- 路傍の草
- 小浅間
- 小爆発二件

## 第二章、科学について 30編

- アインシュタイン
- アインシュタインの教育観
- 科学者と芸術家
- 物理学と感覚
- 相対性原理側面観
- 怪異考
- 比較言語学における統計的研究法の可能性について
- 化け物の進化
- ルクレチウスと科学
- 火山の名について
- 日常身の物理的諸問題
- 量的と質的と統計的と
- 物理学圏外の物理的現象
- ロプ・ノールその他
- 鐘に響く《ちぬ》る
- 自然界の縞模様

- 物質群として見た動物群
- 感覚と科学
- 鎖骨
- 神話と地球物理学
- 科学と文学
- 科学者とあたま
- 人魂の一つの場合
- 疑問と空想
- 時の観念とエントロピーならびに  
プロバビリティ
- 茶わんの湯
- 数学と語学
- 蒸発皿
- 試験管
- 北氷洋の氷の割れる音



カ4

## 摩擦力（運動に抵抗する力）

「この世に摩擦がなければどうなるのか」



小柴昌俊（2002）

ニュートリノ天文学の先駆的な貢献に対して

jointly to Raymond Davis Jr. and Masatoshi Koshiba "for pioneering contributions to astrophysics, in particular for the detection of cosmic neutrinos" and the other half to Riccardo Giacconi "for pioneering contributions to astrophysics, which have led to the discovery of cosmic X-ray sources".

Topic

## もし摩擦がなかったら

ノーベル物理学賞を受賞した小柴昌俊氏のエピソードには、「この世に摩擦がなければどうなるのか」という問題を試験に出したことがあるという。摩擦がないと鉛筆の先が滑って紙に文字は書けなくなる。そのため、この問題の正解は何も解答欄に記入しない白紙答案だった、という。解答を記入すると不正解になる超難問といえよう。



Did slippery sand help Egyptians build the pyramids?

エジプトに残された絵画には、石像を運ぶ列に水を持つ人々が描かれていた。宗教的なものと考えられていたが、この理由を考えた物理学者は、潤滑油であるとの説を論文発表した。少量の（5%程度の）水を加えると、物質を引く力は20%ほど小さくて済む、という。加えすぎると逆に粘性が生じることもわかった。




FIG. 2 (color online). Force-displacement curves for wet and dry Iranian sand. Inset: Picture of the setup. The picture on the left was taken while sliding over dry normalized sand. The picture on the right was taken while sliding over normalized sand wetted with 5% water. In the dry sand, a heap clearly builds up in front of the sled. The  $11 \times 7.5$  cm sled is made out of PVC with rounded edges (as the Egyptian sled) and a roughness of  $35 \mu\text{m}$  with sandpaper on its bottom; the results were qualitatively similar but less reproducible with a smooth bottom.



FIG. 1 (color online). Wall painting from 1880 B.C. on the tomb of Djehutihotep [1]. The figure standing at the front of the sled is pouring water onto the sand.

PRL 112, 175502 (2014)

PHYSICAL REVIEW LETTERS

week ending  
2 MAY 2014

### Sliding Friction on Wet and Dry Sand

A. Fall,<sup>1</sup> B. Weber,<sup>1</sup> M. Pakpour,<sup>1,2</sup> N. Lenoir,<sup>3</sup> N. Shahidzadeh,<sup>1</sup> J. Fiscina,<sup>4,5</sup> C. Wagner,<sup>4</sup> and D. Bonn<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Van der Waals-Zeeman Institute, IoP, University of Amsterdam, Science Park 904, 1098XII Amsterdam, Netherlands  
<sup>2</sup>Institute for Advanced Studies in Basic Sciences, P.O. Box 45195-1159 Zanjan, Iran  
<sup>3</sup>Material Imaging, UR Navier, 77420 Champs-sur-Marne, France  
<sup>4</sup>Experimental Physics, Saarland University, D-66123 Saarbrücken, Germany  
<sup>5</sup>Gravitation Group, TATA Institute of Fundamental Research, 1 Homi Bhabha Road, 400005 Mumbai, India  
 (Received 28 August 2013; revised manuscript received 13 November 2013; published 29 April 2014)

We show experimentally that the sliding friction on sand is greatly reduced by the addition of some—but not too much—water. The formation of capillary water bridges increases the shear modulus of the sand, which facilitates the sliding. Too much water, on the other hand, makes the capillary bridges coalesce, resulting in a decrease of the modulus; in this case, we observe that the friction coefficient increases again. Our results, therefore, show that the friction coefficient is directly related to the shear modulus; this has important repercussions for the transport of granular materials. In addition, the polydispersity of the sand is shown to also have a large effect on the friction coefficient.

<http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.112.175502>

<http://physicsworld.com/cws/article/news/2014/may/06/did-slippery-sand-help-egyptians-build-the-pyramids>

<http://physicsworld.com/cws/article/news/2007/dec/03/wet-sand-flows-better-than-dry>



#### 実験4 テーブルクロス引き

だるま落としでは、一番下のブロックを勢いよくたたいても上のブロックが慣性の法則により留まり、そのまま下に落下する。テーブルクロス引きの芸も同様である。勢いよく引いたクロスの上の皿やコップがそのまま残るのは慣性の法則である。被害を最小にするため、慣れるまでは皿やコップを使う代わりに、机の上でペンなどを載せた紙を引っ張って確かめよう。




図 2.51 テーブルクロス引き





## NHK「大科学実験」リンゴは動きたくない！？

成功したテーブルクロス引きから、布を引き抜くスピードによって摩擦の大きさがことなることを知る実験。





時速140kmで走るレーシングカーを使い、10mの巨大テーブルクロス引きをする実験。







7日 (月) Physiology or Medicine

8日 (火) Physics

9日 (水) Chemistry

10日 (木) Literature

11日 (金) Peace

14日 (月) Economic science

<https://www.nobelprize.org>



# ノーベル賞

Nobel Prize




- 安全に運搬・保管できる爆薬のダイナマイトの発明などで巨万の富を築いたスウェーデンの実業家、アルフレッド・ノーベルの遺産を基に、1901年に創設された賞
- 創設当初は物理学、化学、生理学・医学、文学、平和の5賞、69年に経済学が加わり6賞となった。
- ノーベル賞を運営するのはスウェーデンのストックホルムに本部がある「ノーベル財団」
- ノーベル財団は基金を株式や国債、不動産などで運用し、賞金や運営費用を確保することが主な役割で、賞の選考には関わらない。経済学賞の賞金だけはスウェーデン国立銀行が用意する。

賞	選考組織
物理学賞	スウェーデン王立科学アカデミー
化学賞	スウェーデン王立科学アカデミー
生理学・医学賞	カロリンスカ研究所
文学賞	スウェーデンアカデミー
平和賞	ノルウェー・ノーベル委員会
経済学賞	スウェーデン王立科学アカデミー

- 授賞式はノーベルの命日である12月10日に、平和賞以外の5賞はスウェーデンのストックホルムで、平和賞はノルウェーのオスロで開かれる。賞金額は2001～11年まで1000万スウェーデン・クローナ（現行レートで約1億4000万円）だったが、運用益の減少などを理由に12年からは800万クローナ（同約1億1000万円）に減額された。



## ノーベル賞選考の大まかな流れ



<https://www.nikkei4946.com/>

賞	選考組織
物理学賞	スウェーデン王立科学アカデミー
化学賞	スウェーデン王立科学アカデミー
生理学・医学賞	カロリンスカ研究所
文学賞	スウェーデンアカデミー
平和賞	ノルウェー・ノーベル委員会
経済学賞	スウェーデン王立科学アカデミー

- 受賞者の選考過程は受賞の50年後まで明かされない。
- 専門家が「推薦された研究者が本当に最初に手掛けたものか」「同様の成果を挙げた研究者が他にいないか」などを調査し、候補者を絞り込む。特に自然科学3賞は「最初」にこだわる。



# 最近のノーベル物理学賞 受賞者

## Nobel Laureates in Physics

年度	受賞者	分野	顕彰タイトル
<a href="#">2023</a>	Pierre Agostini Ferenc Krausz Anne L' Huillier	量子光学	物質中の電子の動きを研究するためのアト秒光パルスを発生させる実験方法の確立
<a href="#">2022</a>	Alain Aspect John F. Clauser Anton Zeilinger	量子実験	量子もつれの光子の実験, ベルの不等式の破れの実証と量子情報科学の創設
<a href="#">2021</a>	眞鍋淑郎 Klaus Hasselmann Giorgio Parisi	複雑系	「地球気候の物理モデル化, 地球温暖化の確たる予言と量的変動への貢献(眞鍋, Hasselmann)」 「原子から惑星スケールに及ぶ無秩序と擾乱の相互作用の発見 (Parisi)」
<a href="#">2020</a>	Roger Penrose Reinhard Genzel Andrea Ghez	宇宙物理	「ブラックホール形成が一般相対性理論の枠組みでごく自然な帰結となることの発見(Penrose)」 「天の川銀河の中心に超大質量なコンパクト天体を発見したこと(Genzel, Ghez)」
<a href="#">2019</a>	James Peebles Michel Mayor Didier Queloz	宇宙物理	「物理的宇宙モデルにおける理論的な発見(Peebles)」 「太陽系外惑星の発見 (Mayor, Queloz)」
<a href="#">2018</a>	Arthur Ashkin Gerard Mourou Donna Strickland	物性物理	レーザー物理学の分野における革命的な発明
<a href="#">2017</a>	Rainer Weiss Barry C. Barish Kip S. Thorne	宇宙物理	LIGO検出器と重力波観測への決定的な貢献
<a href="#">2016</a>	David Thouless Duncan Haldane Michael Kosterlitz	物性物理	物質のトポロジカル相転移とトポロジカル相の理論的な発見
<a href="#">2015</a>	梶田隆章 Arthur B. McDonald	素粒子物理	ニュートリノが質量を持つことを示すニュートリノ振動の発見
<a href="#">2014</a>	赤崎勇 天野浩 中村修二	物性物理	高輝度でエネルギー効率のよい白色光を実現する青色発光ダイオードの開発



“物質中の電子の動きを研究するためのアト秒光パルスを発生させる実験方法の確立”

The Nobel Prize in Physics 2023 was awarded jointly to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L'Huillier "for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter"



Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Pierre Agostini

Prize share: 1/3



Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Ferenc Krausz

Prize share: 1/3




Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Anne L'Huillier

Prize share: 1/3

ピエール・アゴスティーニ (82) 米オハイオ州立大  
 フェレンツ・クラウス (61) 独ミュンヘン大  
 アンヌ・リュイリエ (65) スウェーデン・ルンド大




© Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences



# 10進数 大きさを表す接頭語

表 1.3 大きさを表す接頭語

大きさ		接頭語	記号		
$10^{24}$	1,000,000,000,000,000,000,000,000	ヨタ	yotta	Y	
$10^{21}$	1,000,000,000,000,000,000,000	ゼツタ	zetta	Z	
$10^{18}$	1,000,000,000,000,000,000	エクサ	exa	E	100 京
$10^{15}$	1,000,000,000,000,000	ペタ	peta	P	1000 兆
$10^{12}$	1,000,000,000,000	テラ	tera	T	Trillion 1 兆
$10^9$	1,000,000,000	ギガ	giga	G	Billion 10 億
$10^6$	1,000,000	メガ	mega	M	Million 100 万
$10^3$	1,000	キロ	kilo	k	Thousand 千
$10^2$	100	ヘクト	hecto	h	Hundred 百
10	10	デカ	deca	da	Ten 十
1	1				One 一
$10^{-1}$	0.1	デシ	deci	d	Tenth
$10^{-2}$	0.01	センチ	centi	c	Hundredth
$10^{-3}$	0.001	ミリ	milli	m	Thousandth
$10^{-6}$	0.000001	マイクロ	micro	$\mu$	Millionth
$10^{-9}$	0.000000001	ナノ	nano	n	Billionth
$10^{-12}$	0.000000000001	ピコ	pico	p	Trillionth
$10^{-15}$	0.000000000000001	フェムト	femto	f	1000兆分の1
$10^{-18}$	0.000000000000000001	アト	atto	a	100京分の1
$10^{-21}$	0.000000000000000000001	ゼプト	zepto	z	
$10^{-24}$	0.00000000000000000000001	ヨクト	yocto	y	




1000兆分の1

100京分の1



“量子もつれの実験, Bell不等式の破れの確認による量子情報科学の創始”

量子もつれ (エンタングルメント, entanglement)



The Nobel Prize in Physics 2022 was awarded to [Alain Aspect](#), [John F. Clauser](#) and [Anton Zeilinger](#) “for experiments with entangled photons, establishing the violation of Bell inequalities and pioneering quantum information science”.

Their results have cleared the way for new technology based upon quantum information.

**Alain Aspect**

Université Paris-Saclay and  
École Polytechnique, Palaiseau, France

**John F. Clauser**

J.F. Clauser & Assoc.,  
Walnut Creek, CA, USA

**Anton Zeilinger**

University of Vienna, Austria

**アラン・アスペ (75) 仏パリ・サクレ大**

**ジョン・クラウザー (79) 米 クラウザーアソシエイツ社**


**アントン・ツァイリンガー (77) オーストリア・ウィーン大**



## “複雑系システムへのブレークスルー”



Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach  
Syukuro Manabe  
Prize share: 1/4



Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach  
Klaus Hasselmann  
Prize share: 1/4



Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach  
Giorgio Parisi  
Prize share: 1/2

This year's Nobel Prize in Physics is awarded with one half jointly to [Syukuro Manabe](#), [Klaus Hasselmann](#) and the other half to [Giorgio Parisi](#). They have laid the foundation of our knowledge of the Earth's climate and how humanity influences it, as well as revolutionized the theory of disordered materials and random processes.

**真鍋淑郎 (90) 米プリンストン大**

**クラウス・ハッセルマン (90) 独マックスプランク研究所**

**「地球の気候変動の物理的なモデル化, 変動の見積もり, 地球温暖化の確たる予言に対して」**

Prize motivation: "for the physical modelling of Earth's climate, quantifying variability and reliably predicting global warming."

**ジョージオ・パリージ (73) 伊ローマ・サピエンザ大学**

**「原子から惑星スケールにおよぶ物理系における非秩序と揺らぎの関係を発見したことに対して」**

Prize motivation: "for the discovery of the interplay of disorder and fluctuations in physical systems from atomic to planetary scales."



## “ブラックホール”

ロジャー・ペンローズ (89) 英オックスフォード大

「ブラックホール形成が一般相対性理論におけるごく自然な帰結となることの発見に対して」

ラインハルト・ゲンツェル (68) 独マックスプランク研究所

アンドレア・ゲズ (55) 米カリフォルニア大ロサンゼルス校

「天の川銀河の中心に超大質量なコンパクト天体を発見したことに  
対して」



**Roger Penrose** “for the discovery that black hole formation is a robust prediction of the general theory of relativity”

**Reinhard Genzel** and **Andrea Ghez** “for the discovery of a supermassive compact object at the centre of our galaxy”.





# 論座 R O N Z A

19450 本の記事が読み

[論座とは？](#) | [よくある質問](#) | [お問い合わせ](#)


政治・国際

経済・雇用

社会・スポーツ

科学・環境

文化・エン

[科学政策](#) | [科学者論](#) | [テクノロジー](#) | [基礎科学](#) | [宇宙](#) | [生命・医療](#) | [原発](#) | [地球環境](#) | [生態系](#) | [自然史・進化](#)
[論座](#) > [科学・環境](#) > [記事一覧](#) > [記事](#)

科学・環境

## 「ブラックホール」でまとめたノーベル物理学賞

理論家ペンローズの並外れた業績と、「謎」を「実在」に転換させた長年の天文観測

真貝寿明 大阪工業大学教授（相対性理論、宇宙物理学、天文学史）

[ノーベル賞](#) | [ブラックホール](#) | [基礎科学](#) | [宇宙](#)

2020年10月13日

ツイート

おすすめ 221

シェア

B! 0

コメント 0件

印刷

list

真貝寿明 大阪工業大学教授（相対性理論、宇宙物理学、天文学史）

[ノーベル賞](#) | [ブラックホール](#) | [基礎科学](#) | [宇宙](#)

2020年10月13日

ツイート

おすすめ 221


シェア

B! 0

コメント 0件

印刷

list



イラストはNASA提供

2020年のノーベル物理学賞は、ブラックホールの研究業績をテーマとして、英オックスフォード大のロジャー・ペンローズ（89）、独マックスプランク研究所のラインハルト・ゲンツェル（68）、米カリフォルニア大ロサンゼルス校のアンドレア・ゲズ（55）の3氏に贈られると発表された。贈賞理由は、ペンローズは「ブラックホール形成が一般相対性理論におけるごく自然な帰結となることの発見に対して」、ゲンツェルとゲズは「天の川銀河の中心に超大質量なコンパクト天体を発見したことに対して」となっている。

<https://webronza.asahi.com/science/articles/2020101000005.html>



科学・環境 無料


## 「ブラックホール」でまとめたノーベル物理学賞

理論家ペンローズの並外れた業績と、「謎」を「実在」に転換させた長年の天文観測

真貝寿明 大阪工業大学教授（相対性理論、宇宙物理学、天文学史）

ノーベル賞 | ブラックホール | 基礎科学 | 宇宙 2020年10月13日

ツイート list おすすめ 28 シェア B! 0 noteで書く コメント 0件 印刷



イラストはNASA提供

2020年のノーベル物理学賞は、ブラックホールの研究業績をテーマとして、英オックスフォード大のロジャー・ペンローズ（89）、独マックスプランク研究所のラインハルト・ゲンツェル（68）、米カリフォルニア大サンゼルス校のアンドレア・ゲズ（55）の3氏に贈られると発表された。贈賞理由は、ペンローズは「ブラックホール形成が一般相対性理論におけるごく自然な帰結となることの発見に対して」、ゲンツェルとゲズは「天の川銀河の中心に超大質量なコンパクト天体を発見したことに対して」となっている。

物理学賞は、こここのところ、宇宙・素粒子分野と物性物理分野が毎年交互に選ばれてきた。昨年は宇宙分野だったため、私は（他の多くの方と同じように）今年は宇宙以外の分野を想定していた。個人的には光格子時計に期待していて、学生にもその説明を公表の前週にしていたところだ。発表中継をインターネットで見ている、まず、分野が宇宙だと知って驚き、さらに純粋な理論研究者であるペンローズが受賞したとわかり、想定外の嬉しさを隠せない。ここでは、ペンローズの業績を中心に紹介しながら、ブラックホール研究の歴史を振

https://webronza.asahi.com/science/articles/2020101000005.html

り返ってみたい。

### ブラックホールにアインシュタインは拒絶反応を示していた

質量の大きな星が燃え尽きると、最終的には中性子の塊（中性子星）か、ブラックホールになると考えられている。ブラックホールとは、重力が強すぎて、光でさえも抜け出せない領域のことである。昨年4月には、イベント・ホライズン・テレスコープ（EHT）のチームが、M87銀河の中心にある「黒い穴」の撮影に成功したことを発表し、話題となった。



日米欧の研究チームが2019年4月に発表した、M87銀河のブラックホールの画像。黒い穴の部分がブラックホール=①EHT collaboration

強い重力場のふるまいを描くのは、アインシュタインの一般相対性理論である。この理論は、重力の正体を「空間のゆがみ」で説明し、時間も空間も絶対的なものではなく、伸びたり縮んだりすることを結論する。理論的な整合性を突き詰めて得られた「アインシュタイン方程式」から導かれることになるのは、ブラックホール・膨張宇宙・重力波の存在といった現象である。しかし、アインシュタイン自身がこの3つのいずれにも当初拒絶反応を示したことは面白い。

一般相対性理論が発表された直後にシュヴァルツシルトがアインシュタイン方程式を解き、解を見つけたが、その中には無限大となってしまう奇妙な空間の点（時空特異点と座標特異点）が含まれていた。アインシュタインはその理解に苦しみ、この解は簡略化された仮定のもとに得られたものであったため、「実際にはあり得ない話」と解釈したようである。ブラックホールという言葉が生まれたのは、アインシュタインの没後である。

### 相対論研究でもっとも貢献したペンローズ



オックスフォード大学のR・ペンローズ教授=1995年10月6日、オックスフォード大の研究室、尾関章撮影

アインシュタイン以降、相対性理論の研究でもっとも貢献した3名を挙げよ、という問いかけがあったとしよう。相対性理論の研究者なら、答えは「ペンローズ、ペンローズ、ペンローズ」となる。これは研究者間でウケる冗談だが、ある意味本当だ。


一般相対性理論は、時空を対象とする物理であって、身の回りの現象とはかけ離れた理論であり、1950年代の終わりまでは研究者からも避けられていた。60年代になって、正体不明のクエーサーという天体の存在が報告され、一方で回転している時空でのブラックホール解が発見され、研究が一気に花開くことになる。この「ルネッサンス期」を牽引したのがペンローズである。

ブラックホールの解には、時空特異点が存在している。特異点（無限大の発散点）が物理的な現象を扱う微分方程式の解に生じるのは不思議である。現実世界には無限大は存在しないからだ。当時多くの研究者は、原因は解を導く時に課した時空の対称性にあると考えていた。ところが、ペンローズは「重力崩壊の状況では時空特異点の発生が避けられない」ことを時空の対称性を課さずに数学的に証明する。1965年に発表した「特異点定理」である。

https://webronza.asahi.com/science/articles/2020101000005.html

# ノーベル物理学賞受賞者 2020年 Nobel Laureates in Physics 2020

ペンローズは、重力崩壊する星から外側に広がっていきこうとする光の経路を考えた。重力がある程度強くなると、光は無制限まで到達できずに、ある距離までしか進めなくなるだろう。そしてその内側にある光は再び星に落下せざるをえず、特異点を形成する。ペンローズの用いた「光の捕捉面」というアイデアは、その最大到達する境界が「事象の地平面（イベント・ホライズン）」と呼ばれるようになり、ブラックホール領域を表す境界面として理解されるようになった。このようにして、ペンローズは、ブラックホールはごく自然な帰結として導かれることを示したのである。そして、数年後にはホーキングと共に、膨張宇宙を考えるならば、宇宙初期にも特異点が存在することを定理にした。




ノーベル財団の発表資料から

ペンローズの受賞理由となったのは特異点定理の業績であるが、この他にもペンローズの名前が業績は多々ある。すぐ思いっただけで、無制限の領域を含めて時空を扱うために座標変換して得られる「ペンローズ・ダイアグラム」、4次元時空を空間+時間と分解せずに光の進行方向を基準にして扱う「ニューマン・ペンローズ形式」、回転するブラックホールからエネルギーを取り出す「ペンローズ過程」、彼の名前はついていないものの重要な業績として、ループ量子重力理論に引き継がれた「スピネットワーク」、そして相対性理論と量子論を統合する可能性をもつ「ツイスター理論」などがある。

### エッシャーの作品に取り入れられた不可能立体

時空特異点がブラックホールの内側に隠れていないと因果関係が保証されず大問題だ。そこで、ペンローズはこれを「『裸の特異点』は禁止される」と表現し、「宇宙検閲仮説」と名付けた。裸の出現を検閲する管理官がどこかにいる、というユーモアも含んだ命名である。この仮説が成立するかどうかは、現在の研究テーマの1つとなっている。



不可能立体の一つ「ペンローズの三角形」

実現不可能な立体や、繰り返し図形で知られる画家エッシャーとの関係をご存知の方も多いただろう。ペンローズの考案した不可能立体の三角形や無限に続く階段はエッシャーの作品に取り入れられ、逆にエッシャーの図柄からペンローズは、非周期的に平面を充填するペンローズ・タイルを考案した。

私は20年ほど前に、米国ペンシルベニア州立大学でポスドクとして武者修行をしたが、ペンローズは毎年何カ月か、客員教授として招致され、隣の研究室に滞在していた。小さな子供を肩車して学内を笑顔で歩き回っていた。彼のプレゼンテーションは、決してパソコンを使わず、OHP（オーバーヘッドプロジェクター、手書きの透明シートを投影する装置で20年前までは学会発表の主流だった）を用意するスタイルだった。カラーのペンで、たくさんの絵が描かれているOHPを使った彼の講演は、数年前の国際会議でも同じだったので、おそらく今年のノーベル賞講演でもそうだろう。インターネット中継となるようなので、楽しみだ。

https://webronza.asahi.com/science/articles/2020101000005.html

次は→見えないブラックホールがどうして観測でわかるのか

先頭 前へ 1 2 次へ 末尾

コメント [利用規約](#)

コメントを入力する(最大500文字)

コメント投稿時には、利用規約を確認・同意したものとみなさせていただきます。

0/500 名前(任意30文字以内) [規約に同意して投稿する](#)

Powered by ユーザーローカルAIコメント

全ジャンルパックなら15897本の記事が読み放題。

全ジャンルパックを購読する

論座ではこんな記事も人気です。もう読みましたか？

- ▶ [「オフレコ懇談会」を問い直す〜菅首相と官邸記者の「バンケーキ朝食会」を機に](#)
- ▶ [「下部構造」がないからアイデアも出ない〜2大政党が育たない理由](#)
- ▶ [「元・学者」が日本学術会議騒動に抱いた大いなる違和感](#)

### 関連記事

- [科学・環境](#) **見えないはずのブラックホールがなぜ見えた?** 平林久 2019年04月16日
- [科学・環境](#) **続々見つかる重力波、高まるKAGRAへの期待** 高橋真理子 2019年05月31日
- [科学・環境](#) **スティーブン・ホーキング——上書きモードの達人** 尾関章 2018年03月26日
- [科学・環境](#) **重力波天文学が始まった** 須藤靖 2017年10月18日
- [科学・環境](#) **重力波の直接観測で宇宙の新しい窓が開いた** 大栗博司 2016年02月12日

### 筆者

**真貝寿明** (しんかい・ひさあき) 大阪工業大学教授（相対性理論、宇宙物理学、天文学史）  
大阪工業大学情報科学部教授、理化学研究所客員研究員。1966年東京生まれ。早稲田大学大学院博士課程修了。主な研究分野は一般相対性理論と天文学史。著書に『ブラックホール・膨張宇宙・重力波』（光文社新書）、『現代物理学が描く宇宙論』『徹底攻略確率統計』（共立出版）、『日常の「なぜ」に答える物理学』（森北出版）など。

https://webronza.asahi.com/science/articles/2020101000005.html



科学・環境

無料

## 「ブラックホール」でまとめたノーベル物理学賞

理論家ペンローズの並外れた業績と、「謎」を「実在」に転換させた長年の天文観測

真貝寿明 大阪工業大学教授（相対性理論、宇宙物理学、天文学史）

ノーベル賞 | ブラックホール | 基礎科学 | 宇宙

2020年10月13日

[ツイート](#)
[list](#)
[おすすめ 31](#)
[シェア](#)
[B! 0](#)
[noteで書く](#)
[コメント 0件](#)
[印刷](#)

### 天の川銀河中心の継続観測でわかったこと

同じく受賞となったゲンツェルとゲズは、私たちのいる銀河（天の川銀河）の中心に、超大質量なブラックホールがあることを突き止めた天文観測の人である。



ラインハルト・ゲンツェル氏はノーベル財団の公式ツイッターから



アンドレア・ゲズ氏はノーベル財団の公式ツイッターから

銀河の中心は我々から見て、いて座の方向にある。ゲンツェル率いるドイツのグループはチリにある南天天文台(ESO)を用いて、そしてゲズ率いるアメリカのグループはハワイにあるケック望遠鏡を用いて、すでに30年近く、天の川銀河の中心を継続的に観測している。どちらも、補償光学という技術を導入した。これは、地上からレーザー光を望遠鏡の視野に放ち、人工的な星をつくって大気揺らぎを計測し、それを差し引くことで遠い天体のデータを修正する技術である。

このようにして得られた星の軌道は実に説得力があるものだった。例えばゲンツェルらがS2と名付けた（ゲズらはS02と名付けた）星は、16年の周期で楕円運動をしている（図参照）。この事実は、楕円の焦点に巨大な重力源が存在していることを示していて、この場所こそが、電波天文学者らによって命名されていた天の川銀河の中心（いて座Aスター、Sgr A\*）だということがわかる。

天の川銀河の中心の位置は、その他の星の運動からも推測され、矛盾なく定まるようになった。何も見えないその場所に太陽質量の400万倍の質量があると考えられることから、超大質量ブラックホールが存在している、と結論された。

### 重力波で格段に進むであろうブラックホール研究

宇宙には星の数ほどの星があり、銀河の数ほどの銀河がある。そして、ほとんどすべての銀河の中心には超大質量ブラックホールがあると考えられている。昨年、ブラックホールの直接撮像に成功したEHTプロジェクトは、次に天の川銀河中心の撮像を計画しているそうである。ブラックホールがダイナミックに姿を表す動画が見られることを期待したい。

超大質量ブラックホールの成り立ちはまだ解明されていない。宇宙の初期にガスがつぶれて、はじめから巨大ブラックホールができたとする説がある。一方で、小さいブラックホールが合体を繰り返して成長していくとする説がある。最近では、どの銀河も中心ブラックホールとともに成長していく「共進化」と呼ばれる考えも出ており、今後さまざまな観測データと共に銀河形成のシナリオも更新されていくことになる。

ブラックホール研究に大きな力を発揮するのが重力波である。2015年9月には、欧米の重力波観測チームが、ブラックホールの合体による重力波を初めて直接観測した。先月には、太陽質量の150倍と見られるブラックホールの痕跡の発見を報告して注目を集めている。

重力波の観測は、これからも新しい情報を次々ともたらしていくだろう。筆者が関わっている日本の重力波観測装置KAGRA（かぐら）も、米欧との共同観測体制を整えて本年はじめて稼働したが、残念ながら新型コロナの影響で米欧の観測装置が先に止まり、共同観測が中断した。2022年に再開する次期共同観測での成果にご期待いただきたい。

よく指摘されることだが、ノーベル賞で顕彰されるのは、成果が定まった過去の仕事である。とくに理論的な仕事が評価されるまでには10年、20年と時間がかかる。今回のペンローズの業績は55年前の研究である。ノーベル賞を獲ることは科学研究の目的ではないし、国別のノーベル賞受賞者数で一喜一憂するのもおかしな話だと思う。しかし、試行錯誤を繰り返しながら、独創的なアイデアで進める科学研究を、どれだけ各国が応援していく体制になっているのかを示す指標にはなっていないはずだ。論

次の記事

# ノーベル物理学賞受賞者 2020年 Nobel Laureates in Physics 2020

2020/10/13 14:26

「ブラックホール」でまとめたノーベル物理学賞 - 真貝寿明 | 論座 - 朝日新聞社の言論サイト

コメント [利用規約](#)

コメントを入力する(最大500文字)

コメント投稿時には、利用規約を確認・同意したものとみなさせていただきます。

0/500

名前(任意30文字以内)

[規約に同意して投稿する](#)

Powered by [ユーザーローカル](#)AIコメント

全ジャンルパックなら15897本の記事が読み放題。

[全ジャンルパックを購読する](#)

論座ではこんな記事も人気です。もう読みましたか？

▶ [「オフレコ懇談会」を問い直す～菅首相と官邸記者の「バンクーキ朝食会」を機に](#)

▶ [「下部構造」がないからアイデアも出ない～2大政党が育たない理由](#)

▶ [「元・学者」が日本学術会議騒動に抱いた大いなる違和感](#)

### 関連記事



科学・環境 [見えないはずのブラックホールがなぜ見えた？](#)

平林久 2019年04月16日




科学・環境 [続々見つかる重力波、高まるKAGRAへの期待](#)

高橋真理子 2019年05月31日



科学・環境 [スティーブン・ホーキング——上書きモードの達人](#)

尾関章 2018年03月26日



科学・環境 [重力波天文学が始まった](#)

須藤靖 2017年10月18日



科学・環境 [重力波の直接観測で宇宙の新しい窓が開いた](#)

大栗博司 2016年02月12日

### 筆者



真貝寿明 (しんかい・ひさあき) 大阪工業大学教授（相対性理論、宇宙物理学、天文学史）

大阪工業大学情報科学部教授、理化学研究所客員研究員。1966年東京生まれ。早稲田大学大学院博士課程修了。主な研究分野は一般相対性理論と天文学史。著書に『ブラックホール・膨張宇宙・重力波』（光文社新書）、『現代物理学が描く宇宙論』『徹底攻略確率統計』（共立出版）、『日常の「なぜ」に答える物理学』（森北出版）など。

真貝寿明の記事



NATIONAL  
GEOGRAPHIC  
CHANNEL

# SCIENCE OF STUPID

「バ科学」の世界へ  
ようこそ

ScienceOfStupid1.mov (1:20)  
sled.mov (2:30)



〔3-1〕 車が急ブレーキを踏んだ。車内で浮かんでいる風船は、前へ？それとも後ろへ？  
理由もつけて答えよ。

〔3-2〕 (本日の講義から)

ニュートンの運動の第2法則で、力をゼロとすれば加速度がゼロ（すなわち等速運動）となって、第1法則（慣性の法則）を再現する。だから第1法則は不要と考える人に、その必要性をどう説明しますか？

〔3-3〕 (次回講義のアンケート)

ジェットコースター、あなたは最前列に乗る派？後ろに乗る派？  
その理由は？

〔3-4〕 通信欄。 (講義で取り上げて欲しい疑問・要望・連絡事項など、何かあれば)